

[La perception du temps (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0389

SourceBoite_044_A-17-chem | [sans titre]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Fraisie, Paul](#)
- [Richet](#)
- [Woodrow, Herbert](#)
- [Wundt](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

389 5

Calabresi a utilisé une tachistoscopie : il
présentait 2 cartes $\pm 1/100^e$ de sec. si on donne en
succession immédiate 2 cartes, le sujet perçoit 2/ou
4 de lettres, si la perception de la 1^{ère} < celle q'd
la 2^{de} c/ce.

suivant le nombre sur 1 carte : le sujet perçoit 3,6c.

8 lettres : 3,7 lettres.

Mais si les 2 cartes se succèdent, le sujet devient
un 7,2. On fait varier l'intervalle de présentation

cs	lettres
45 cs	4,4
20 cs	5,5
40	5,6
70 cs	6,5
100 cs	7,2
120 cs	7,2

On peut dire que le percepteur de la 1^{ère}
carte demande entre 70 et 100 cs.

© Conditionnement

Exp^{er} sur le conditionnement. q'd on conditionne
le animal, il faut que le conditionnant précède
de peu le conditionné : l'intervalle optimum est
de 50/100^e sec.



on peut rapprocher les données de celles
de Maclure (l'intervalle critique q'd il faut
60 à 100 cs).

Ch. Richet a dit remarquer qu'il devait exister
des s.r. 1 phase re/marchant: on ne peut lire + de 10
et on ne peut, lire + de 10. gents a la re. Il en conclut
qu'il y avait 1 phase re/marchant et en ce cas. Bruner
et Scheruington pensent + forte que: $\Delta t + 1$ m. h. l. s. r.
et l. s. r.

2 Appréciation de la durée perçue

3 catégo de temps

- temps courts au dessous de 50 cs.
- temps moyens entre 50 et 100 cs
- temps longs entre 100 et 120 cs

A ces 3 sortes de temps correspondent des perceptions
différentes. Vierordt (Tübingen) remarque que
on surestime les temps courts, on estime les temps
longs; on juge au milieu les temps moyens.

on appelle parfois au temps moyen le nom de temps
d'indifférence (marche le marchait à 60 cs).

Le temps d'indifférence sert à mesurer le "temps
personnel" des individus (il peuvent varier d'1/2 sec
à 5 sec). Ces différences s'expliquent: Δt = du phéno
de contraction; Δt = naissance d'impressions nouvelles
(cf. les points) Fraïde a l'échelle de 30 cs à 150 cs,
a trouvé 1 temps d'indifférence = 115 cs; a l'échelle
de 30 cs à 12 sec, il trouve 1 temps d'indifférence de 4 sec.
(Arch. de 4)

Woodrow a pu l'échelle de stimulus de 30
cs. à 400 cs; Chaque sujet devait reproduire / un stimulus