

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-17-chem | \[sans titre\]](#)[Item\[La perception du temps \(suite\)\]](#)

[La perception du temps (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0390

SourceBoite_044_A-17-chem | [sans titre]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Woodrow, Herbert](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

30 cs, erreur systématique	+ 6,2 %	390 ⁶
60	+ 0,33 %	
70	- 0,84 %	
120	- 2,08 %	
400	- 4,6 %	

D'où par extrapolation temps d'ind. τ (62,5 cs.)

3 La sensibilité $\neq$ celle de la sens. temporelle.

a Difficulté de m.e.t. : les excitation se suivent, mais
pas de réversibilité, et les intervalles entre les excitation
sont de la même nature que les stimulations.

3 difficultés

1. erreur de période : ordre et lequel se suivent les
stimulations.

2. intervalle temporel qui s'écoule entre les intervalles
à comparer. Cet intervalle peut être éliminé grâce
à la distinction des intervalles nuls.

3. mais dans ce cas, il y a une incubation et rythme
ou tout au - groupement

La m.e.t. de comparaison n'a pu donner de
bons résultats.

b Les résultats

D'où un plan de reproduction : pour la durée d'
stimulation en la reproduisant. Cette m.e.t. a donné
les résultats suivants : la variabilité est

BnF
MSS

minima pour l'intervalle d'intensité.
 Résultats de Woodrow (σ = mill. de sec).

$\sigma = \frac{\sigma}{M} \times 100$
 σ = en. e. blanc)

200	Variabilité
20 cs	10,3%
40	8,5%
60	1,8%
80	8,2%
100	8,6%
150	8,8%
200	10,1%

Ceci a été calculé avec des excitations audiotones.
 Goodfellow a trouvé 1 seul diff. de 7% pour l'audition, de 9% pour le tact, 11% pour la vue.

Un autre auteur a montré que si on orne les yeux, la vue et le tact s'éduquent très vite. C'est sans doute la marque d'habitude qui détermine la vue et le tact.

Pas de lien entre la notion de la simultanéité.

La loi de Weber s'applique-t-elle

1. La loi de Weber s'applique essentiellement à des diff. quantitatives d'intensité:

2. Pour tout le résultat ci-dessus nous constatons qu'il y a (analogie avec la loi de Weber, pour les valeurs en + les moindres: mais les valeurs sont pour valeurs

