

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage Item\[Rupture expérimentale de l'activité nerveuse \(suite\)\]](#)

[Rupture expérimentale de l'activité nerveuse (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0462

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La ionnerie n°2, rupture de l'AVS : 462

perurbation de bleu refl. moteurs à l'insen
hires conditionnés ; refus de s'aligner
et de transiter ; le mot sans valentis et
sans assurance. L'animal est prêt à
être répressif.

En dehors de la salle de l'abo, m. qd :
le chien est recroquevillé de sa vie

Concl

- Selon Anderson et Liddel, la névrose
expérimentale n'est qu'un trouble du mouve-
ment dynamique des processus corticaux, coécutif à
des influences fonctionnelles nocives

Les perturbations motrices résultent d'un
fait que l'animal, attaché, cherche à se
libérer de ses entraves. BnF
MSS

- En réalité, ce expérimental prouve que l'on
peut obtenir la névrose expérimentale à des conditions
de liberté de l'animal.

De la théorie des névroses expérimentales peut
être tirée la clinique.

After (Raison n°5)

