

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage](#) [Item](#)[L'induction réciproque](#)

L'induction réciproque

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_A_f0470**

Source**Boite_044_A-22-chem | L'apprentissage**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

L'induction réciproque, appliquée à la physiopathologie

- A l'ors que normalement ~~que~~ l'induction
réciproque assure et consolide le cours et la
concentration du processus nerveux

- ds des modifications patho, il y a
anomalie de la propagation entre la reg.
corticale et la région ss corticale, entre
les 2 syst. de signalisation

1 ds l'hystérie : induction négative
développée à partir de la région ss-corticale
fortement chargée, vers / cortex faiblement chargé

2 ds la paranoïa, induction négative à
partir de l'écorce, vers le ss. cortex, et du
2^{ème} vers le 1^{er}

BnF
MSS

3 ds la névrose obsessionnelle : diffusion
de l'inhibition induite à partir du foyer
d'excitation pathologique vers le
reste du cortex, et vers la région ss corticale

4 chez les catatoniques, l'exploration de
l'excitation affective, sans le résultat

