

La cure de sommeil

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**044_A_f0471**

Source**Boite_044_A-22-chem | L'apprentissage**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

la cure de sommeil

471

Technique : combinaison de 2 méthodes

(a) administration de narcotiques

(b) suppression des excitations extérieures (notamment)

2 méthodes

- sommeil partiel : faire dormir le malade de 15 à 20 h. par jour (ceci pendant 15 à 20 jours) : le malade est réveillé 3 fois par j. à heures régulières pour s'alimenter, et éliminer.

- sommeil prolongé : faire dormir le malade 24 h. sur 24, pendant 10 à 12 j. Le malade est alimenté par des injections de serum glucose. (au besoin, cathétérisme vésical; et lavement intestinal)

les narcotiques : en g^l, amylobarbitique, moins toxique que le grégotine. on l'accompagne souvent de bronchodilatateurs mineurs (hydrate de chloral)

son utilisation

- pour schizo voir fiche

BnF
MSS

- en neuro, pr les cours + lecture les trésumés
 l'unes crânio-cérébraux
 statistique du prof Crachenmor

Méth.	nbre	Fracture du crâne			Durée	Résultats		
		simple	ouvert	lésions au foyer		Bon	stabil- pneum	hémorrag
Cure de sommil	91	8	36	35	13j	38	7	0
sans cure de sommil	22(?)	3	8	5	17j	4	10	2

- Friedman cite des résultats pr la lésion
 artérielle (semaine de hospitalisation. n=84.
 14. nov. 1951)

La Hite. (Rauin - 3)