Types et maladie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0475
SourceBoite_044_A-22-chem | L’apprentissage
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Types et maladie

"Ce sont les 2 types extrêmes [à prédominance très prononcée d'excitation ou d'inhibition] qui présentent le + peut^n la déviation de la norme :

1 Si, à 1 chien excitable, on applique 1 excitant inhibiteur après 1 excitant +, provoquant ainsi 1 choc, l'animal devient agité et perd le pair présenteur : hyperasthénie (1) que l'on peut guérir par du bromure.

2 Si à 1 chien chez qui prédomine l'inhibition on provoque 1 choc : 1 réf. + disproportionné le chien tombe ds 1 état d'inhibition chronique c'est l'hystérie

cf^es sur "la Physio et la patho de l'activité nerveuse sup^re.
Encéphale. 1931. p 682

(1) ou neurasthénie

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1619?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1619?context=pdf