

Types et maladie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0475

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Types et maladie

475

"Ce sont les 2 types extrêmes [à prédominance très prononcée d'excitation ou d'inhibition] qui présentent le + bel ex la déviation de la norme :

1 si, à l'chien excitable, on applique 1 excitant inhibiteur après 1 excitant +, provoquant ainsi 1 choc, l'animal devient g. t. et perd le pouvoir de se défendre : hypersthénie (1) que l'on peut guérir par du bromure.

2 si à l'chien chez quel prédomine l'inhibition on provoque 1 choc : l'animal refl. + dysproportionnel et le chien tombe ds 1 état d'inhibition chronique c'est l'hystérie

cf sur "la Physio et la patho de l'activité nerveuse sup. r."

Encephale . 1931. p 682



(1) ou neurosthénie

