

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage ItemLa maladie selon les successeurs de Pavlov](#)

La maladie selon les successeurs de Pavlov

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0483

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La maladie s/ le succⁿ de Pavlov

"A présent on prend de + en + esc. que l'origine d'une maladie est l'élément non moins compliqué que l'organisme au sein duquel se situe la maladie, que nos attitudes simplifient le processus complexe qui conduit à la maladie, que des actions émotionnelles sont souvent susceptibles d'exercer l'influence la plus puissante que le facteur physique et que qui le plus peut produire des modifications profondes de l'organisme entier."

(Bykov)

Commentaire de Laffitte

"Ce qui caractérise et domine le processus pathologique, ce n'est pas tout ce que la médecine classique, l'attaque microbienne ou virale, l'intoxication, l'traumatisme, ou encore le trouble du métabolisme, ou de la régulation hormonale.

Ce qui permet de saisir l'ensemble du processus morbide et de le caractériser, c'est le trouble de l'activité nerveuse sup^{re}, trouble de l'équilibre métabolique, assuré par la

Bnf
MSS

88
corticale entre le veir et mero et mero ce hem

le trouble de l'activité nerveuse sup-
rejoint à la fois sur

- le comport- social de l'individu
- et par l'intermédiaire du lissim cortico-
viscéral, sur les fonctions organiques

Les modifications entraînées peuvent être
au début uniquement de type fonctionnel
partiellement réversible, pour aboutir, à 2^e
étape au type lésionnel."

La Raison n° 3