

Les types d'incompatibilité dans le comportement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0489

SourceBoite_044_A-23-chem | La dynamique du conflit

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Les types d'incompatibilité et le conflit.

489

Le conflit se produit lorsque les réponses sont incompatibles. L'incompatibilité peut être de plusieurs types:

1/ mécanique: (conformément à la structure physique du corps): la flexion et l'extension du bras.

2/ neurologique: l'incomp. neurologique a été définie par Sherrington / "interaction réciproque" (1906): la corde spinale fonctionne de telle manière que si les muscles qui fléchissent 1 membre sont excités de manière réflexe, les muscles qui assurent l'extension sont relâchés.

- Cette interaction réciproque n'est pas liée à l'incompatibilité physique: le refl. de flexion d'un membre tend à inhiber la flexion de l'autre. D'autre part, + les réflexes sont forts, moins il y a de chances d'être neutralisés, + ils jouent d'abord un rôle de facilitation et d'inhibition.

- De + l'incompatibilité joue aussi selon le centre qui intègre les messages: au niveau du réflexe spinal, les extenseurs se relâchent lorsque les fléchisseurs sont excités; mais les 2 peuvent se

BnF
MSS

