[Les types d'incompatibilité dans le comportement (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0490
SourceBoite_044_A-23-chem | La dynamique du conflit
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

R_{-1} et R_{-2} sont les réponses incompatibles

(β) 2 réponses compatibles à l'origine : mais le sujet apprend à réagir directm̄ aux stimuli qui sont produits par chacune d'elle avec 1 réponse incompatible avec l'autre.



(γ) A l'origine 2 des réponses sont suscitées directm̄ ~~et incompatibles~~ par des stimuli extérieurs et sont compatibles. + tard elles sont suscitées indirectm̄ par des stimuli internes qui interrompent de réponses incompatibles entre elles et provoquent elles-mêmes stimuli



BnF MSS

Miller (Expl studies of conflict. pp 456-458)

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1634?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1634?context=pdf