

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemL'analyse de la mutation](#)

L'analyse de la mutation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0014

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

L'analyse de la nomenclature par J. Vries

14

- En 1895, J. Vries a fait une distinction de Vries peut distinguer par les
Oenothera ^{de} Lamarck, de forme paté,
oblonga, albid, crucifolia, nanella
gigas, et une très nombreuse.

Il en a fait une autre ~~et~~ remarque, et il recon-
naît qu'il y a eu de types stella et
distincts, et les autres types de crucifolia
et de violettes (inclus par Jorda).

2. En croisant ce différent type avec
tous de Lamarck, il remarque

- que les formes crucifolia, foenicifolia,
et nanella se comportent et de manière
restreinte, et que leur descendance suit
le reste numérique de la disposition
méditerranéenne.

- que les formes paté, oblonga,
gigas, sont par contre du type de



espèces éliminées de leur
combinaison sur le type Lamarckien
ou présence de caractéristiques, de
avant

3. En un phrasé d'OE. Lamarckien
de 1905 à 1915, de Vni. & Vni. que
toute source Lamarckienne fournit
un source très peu élevé, mais un
chât de la même.

On a donc de Lam. de 1895, 10
obtus pour 14.000 Lamarckien

1 gigas, 7 176 oblonga + 8 rubricaris,
+ 60 n. n. n. + 73 lata.

6 qu'on a total 2% d'espèces nouvelles,
mante + nombre % n. n. n. n.
1/2 %.

4. L'OE n. n. n. est une plante
importante d'Amérique. Or en
Amérique, elle est très, mais que
Europe elle est un période de multiplicité.