

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemLe contact granule-ovule](#)

Le contact granule-ovule

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0022

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le contact granuleux - ovule. 22
Du rochet

- Auprès de ces animaux :
chez les batraciens, on se fiondrait open
sur des oeufs pondus, le liquide fiondant
est en touchant une surface de
oeuf qui, mobile, et borbore. Par
de canal spécial se biondrait le liquide
fiondant de l'intérieur de l'ovule.

Ceci est alors une regression :
"on peut reporter à mon hypothèse
canal".

- Turpin a découvert sur l'ovule une
ouverture, qu'il appelle micropyle. Il
a observé que l'ovule se traduit
liquide fiondant. Mais il s'agit
d'un hyp. et parce que cet ouverture
est active physio.

Il est noté que cet ouverture est
une prothèse qui se traduit par

BnF
MSS

W u u d m d ' l m m y o n .

Du hochet . he'moin I .

17 123 . 124