

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemLes mécanismes de la fécondation des plantes](#)

Les mécanismes de la fécondation des plantes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0027

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

A. de Candolle. Les méca de la formation
des plantes

27

- A. Mici et Ad. Brongniart
comme le rhizome a 7 période de retour
et le stèle a des épiphytes planés du
retour.

- A. Mici pense que le hôte rhizomique
s'allonge de la longueur du style;
mais les observations ne confirment cette
observation.

- Ad. Brongniart pense que le hôte
"compensé", et que les granules de ce
hôte peuvent ~~être~~ libérés par les
méca in l'utérus jusqu'aux ovules.

S/ lui, c'est le rôle de la force entre
les granules de la pointe et les méca in l'utérus
certaines qui empêchent la formation par
la plus difficile.

- Mais les difficultés moléculaires d'ailleurs



« Gens h^ute rendent problème. h^ute.

— L'écologie de grande et les
animistes sperm, h^ute, h^ute n'est 3
hypothèse

— que le sperm est fourni par le mâle
et nourri par la femelle. C'est l'hypothèse
"la + en accord avec la hist observée;
mais il faut convenir que les observations
sont très incomplètes."

— que le sperm est produit par la femelle
et se développe à l'intérieur
par l'action variable de l'organe
mâle. seule cette 2^e hypothèse
pourrait expliquer la hist observée par Spallanzani

— que le sperm est produit par la femelle
et se développe à l'intérieur par les
2 organes (hyp de Butler, qui rend
les comptes des phénomènes de reconstitution).

A de conduite. Intrad Bo h^u

I. r 354-6