

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemLa structure du pollen](#)

La structure du pollen

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0028

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Cantholle. La structure du pollen.

28

- 2 membranes au tour de chaque grain:
P₁, fine ou granuleuse, et externe;
P₂ ou P₃ interne, très mince, les deux peuvent perdre de l'élasticité par le contact du liquide.
- qd le grain de pollen est au contact du stigmate, ou qu'on le place sous microscope et le liquide gonfle, l'enveloppe interne sort un peu et forme de bords. ce qui est au contact du stigmate, la foveole
- La foveole est ¹liquide moule et indique quel contact de granules. Elle se moule à la tête pollinique. BRF
MSS
Quelques molécules + spon et - molécs sont mélangés aux granules.

Alph. de Candolle

In trad. de Boiss. II. p. 145, 150

