Hypothèse de Brongniart sur la pénétration du tube pollinique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0031
SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Hypothèse de Brongniart sur la pénétration du tube pollinique

– Amici avait découvert la pénétration des utricules polliniques dans le stigmate.

– Brongniart pense qu'au bout d'un certain temps les utricules s'ouvrent à leurs extrémités, et versent la fovilla dans le tissu cellulaire conducteur lui-même. En effet

– ~~avant~~ aussitôt après la pénétration, il voit ~~les grains~~ dans les utricules les grains que la fovilla contient.

– mais au bout d'un certain temps, il ne les voit plus.

Il a vu observé de ces grains près de l'ovule (de la courge)

– Il considère ces grains comme des [illegible] qui se glissent dans les ovules et y deviennent la base de l'embryon.

E. Meyer
in Burdach. II. p. 191

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17305?context=pdf