

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemBurdach, Physiologie](#)

Burdach, Physiologie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0036

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

l'Eupomelia laurina est soustraite
au thier, par des filets stériles et un vase
aux pailles. Les insectes divorcent au filet
mais ne touchant pas à ceux qui restent dans
le thier : on conclut à peine que le
thier amène au stérilité sans cette
opération.

36

— Des plantes d'ichogames, les organes
semblant de 2 sexes n'expriment point à
la microgamète. Koelreuter a montré que les
insectes servant d'intricateur : il prend
17 fleur de la même plante et développe une
fleur de la même plante et stérilise : il
tient de cette manière des organes qui est
une même fleur sous deux noms.



Burdach Phytob

II. 17.21

