

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemLa formation de l'embryon](#)

La formation de l'embryon

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0054

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

mirer. ~~structure~~ la formation de
l'embryon

54

" Des linéaments vasculaires, 1^{er}
indica non agénésique de l'origine de
l'embryon, " développent à la base de
chaque vaine. Les cellules qui avoisinent
les linéaments vasculaires " remplissent
l'ensemble de l'organe. Une déchirure ou ventricule.
cette vaine, au lieu que le vaineur,
gagne de proche en proche; l'origine de la
circulation se centre, l'origine du centre à
la circulation. Le tissu que elle présente
est en gros bien 1 comme organisé
sur lequel la nature travaille à l'échelle
du végétal.



La croissance de l'embryon est rendue
à cette de or de manière: ce sont
d'abord cartilagineux, de centre d'osifi-
cation y mûrissant, ils croissent de rayon,

à la fin, et souvent peu à peu
aux différents points du squelette cette
colonne et cette opère qui caractérisent
le système.

~~27~~

Mirbel. Éléments de
physio. végétale. p 314

ici remodèle ce que Mirbel disait
déjà de Buten de la 10. p 1210
phytomegane. Janvier 1813