Les deux théories sur le tube pollinique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0061
SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les 2 théories sur le tube pollinique

– Ad. Brongniart a vu les tubes polliniques pénétrer à l'intérieur du stigmate et du style, puis s'insérer à l'extrémité inférieure, se crever à leur extrémité et laisser sortir le liquide chargé de granules qui s'écoulent dans leur intérieur. Il a pu suivre la trace des granules de la loritta et les interpréter comme nécessité intercellulaires, depuis leur sortie des tubes polliniques jusqu'à la surface du trophosperme.

– Amici : les tubes polliniques possèdent une extensibilité extraordinaire ; ils s'allongent sans se rompre depuis la surface du stigmate jusqu'à celle du placenta ou trophosperme, où ils se mettent en contact immédiat avec les ovules des ovules.

BnF MSS

Cette opinion a été soutenue en Allem

Mr 150 ans de physiocratie, et
spécialement M.M. Enfantin, Schlaiden, Wagner

A. Michard.
Dict Univ. H. Naturelle
d'Orbigny.

Art. Reinthal

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17335?context=pdf