

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemLes deux théories sur le tube pollinique](#)

Les deux théories sur le tube pollinique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0061

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le 2 Réaction sur le tube pollinique

61

- Ad. Brouguier & me le tube pollinique
que pénétrant de la culotte du stigmate et du
style, puis à mi-à l'extrémité rostrale,
se crever à l'extrémité et laisser le
liquide chargé de granules qui s'écoulent
de leur intérieur. Il a pu suivre la trace de
ces granules de la vante de la in-broche
ou naître in-broche, si par leur sortie
des tubes polliniques par que la surface
de trophoplasme.

- Amici : les tubes polliniques jouissent
d'une extensibilité extraordinaire ; ils s'allongent
sans se rompre devant la surface du stigmate
jusqu'à celle de placenta ou trophoplasme,
où ils se rompent sans contact immédiat avec
le trophoplasme de l'ovule.

Cette opinion a été soutenue par



nr 152 - me de physico-math, d
M. A. L. Richer, Schleiden, Luyten

A. Richard.

Diet Univ. H. No. 1000
J. Orhigny.

Art. Richer