

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045](#) | [Histoire de la sexualité](#).[CollectionBoite_045-1-chem](#) | [Sexualité \[?\] des végétaux](#). XIXe siècle.
[Item](#)[La fécondation des conifères](#)

La fécondation des conifères

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0066

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

D. Le Poussières, les embryons sont x haptes de 11 et 12 chromosomes et la vacuole unique du sac embryonnaire.

- D. le hôte du sac embryonnaire, on voit 7 groupe de petites cellules (que Brown appelle corpuscules). chacune d'entre elles produit à son tour 4 cellules avec lesquelles le tube pollinique vient se mettre en contact

- chacune de ces 4 cellules produit son 1 fil de 4 cellules dont 2 sont la semence de l'embryon et 2 de l'ovule de division successive



- Parmi les embryons un seul arrive à son développement et se reproduit, les autres meurent et leur contenu

ce fait a été observé sur H. m.

Ho fmeiter an d'ur m ~~er~~ Mittel
et spch.

Ducharki.

Memoire sur le moure de la
Molayhyio. 1868

nr 294-5.