

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite\\_045-3-chem | XVIIIe siècle. Item](#)[Preuves des rôles fécondant des pollens selon Needham](#)

# Preuves des rôles fécondant des pollens selon Needham

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb045\_f0105

SourceBoite\_045-3-chem | XVIIIe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

Preuve du rôle fondamental du rôle  
s/ Needham

105

" Cette manière de montrer d'être la source  
de fleurs sans exception ; elle est la source de  
surtout de capsules qui sont en nombre  
des éléments tout au bout du pistil ; les  
globules qui composent celle d'un pistil  
ont la même figure uniforme et régulière ;  
les capsules qui sont fermement sont  
suspendues si délicatement aux cornues,  
ou bien qui les soutiennent par le  
moindre poids de la main ; ceux  
qui s'appliquent à l'agencement d'un pistil  
consistent que ces cornues + nœuds à leur  
repli que la plus grande qui tombe sur leur  
bords ou sur leurs + les pour qu'ils soient  
pleins ; diverses expériences ont ~~montré~~  
approuvé qu'on pouvait se passer de la  
secousse pour qu'on coupe le pistil  
avant que la graine qui il contient

BnF  
MSS

et. un mésoïde de cette poussière; et  
les plantes qui portent une fleur droite  
à droite et à gauche que les hommes,  
et il est + long d'en autres; on trouve  
ce garni de divers types de petits  
mamelons qui ont chacun une ouver-  
ture proportionnée à la grandeur des  
globules de la poussière; il est si bien  
fait qu'il reçoit les globules; en fin  
l'on y découvre de conductes ou trompes  
très fines à donner place à la maté-  
rielle de la poussière par laquelle  
proviennent de la matière ou union de la  
plante.

On a ~~considéré~~<sup>considéré</sup> les ~~autres~~<sup>autres</sup> , joints avec les uns  
qui ont été faits avec le microscope sur  
un bryon de la même, analysés après la  
section montrant "qu'il y a peu de  
matière" on trouve au bout de  
conductes de viciété."

Needham. Les observations microscopiques  
1750. pp 75-77.