

Les différents types de génération

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0158

SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les différents types de génération.

158

I. Héteroogénie :

manifestation d'un côté mâle et d'un côté femelle. gènes très primitifs (8)

II. Homogénie

ou prothécum : est la production d'un individu par le parent

4. Monogénie
- par génération asexuée : une partie organique vive en train qui s'unissent à l'individu par lequel elle a été formée, et avec lequel elle ne forme primitivement qu'un.

- par augmentation du nombre de dissimilité (dissimilité qd elle se fait sans direction ; limitée qd elle se fait d'une direction de terminaison ; toujours ou parfois)

- par multiplication des parties

a. génération surculaire ou gemmation : gemmes ex brues (Tritium repens ; Rhizorhiza) - gemmes d'air brues (p. chez certains Linézoaires)

BnF
MSS

1 génération propagative :
il s'agit d'un organe lié (tubercule, bulbe, bourgeon)

2 reproduction sexuelle

Le germe quitte son lieu de formation et se développe à un autre lieu (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisme mère).

1. Spores : amas globuleux ayant une texture homogène. Elles sont ou agglomérées.

2. Oeuf : cellule végétiforme avec une distinction entre un cytoplasme et un noyau d'embryon.

B. Digénie

2 stades générationnels : "l'un est l'oeuf et l'autre naît le fruit ; l'autre est le sperme qui détermine la formation de l'oeuf ou le fécondé."

Le cycle qui précède se trouve ici résumé en 2 ou 3 employant d'autres termes, il s'agit de développer en 2 moitiés antagonistes qui se rejoignent, le cycle de la vie " (p. 83)

Burckh. ~~Philosophie~~ Physiologie
I. p. 7-83