La fécondation chez les Phanérogames

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0176
SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La fécondation chez les Phanérogames

176

- La fécond. peut s'établir d'abord chez les Cryptogames (Prings heim)

- En 1883, Goroshankin démontre que, chez Pinus, le tube pollinique émis et que 2 anthérozoïdes se trouvent dévoré dans la cellule-oeuf.

- En 1884 ~~ob~~ Strasburger observe la fusion de l'un des noyaux mâles avec le noyau de la cellule oeuf.

(Depuis 1875, on savait que pr les animaux, il y avait fusion du noyau spermatique et du noyau de l'ovule).

BnF MSS

Leroy. Hist de la notion de sexe chez les plantes

p 284-5

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17450?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17450?context=pdf