

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045](#) | [Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-6-chem](#) | [Grew. Ray. Vaillant. Malpighi. Geoffroy.](#)
[ItemLa graine est formée à partir des sucs mâles et femelles](#)

La graine est formée à partir des sucs mâles et femelles

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0189

SourceBoite_045-6-chem | Grew. Ray. Vaillant. Malpighi. Geoffroy.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La gaine et le canal à l'extrémité des
mâles et femelles

189

1 Il y a un suc qui passe à travers le
membrane "acromériste" et "par une
espèce de transmission" : "ce qui est en haut de
la cavité est à peu près à l'échelle de (Poulet)
ce qui est la figure qui est en forme d'un
seul ou la somme des femelles et les
animaux."

2 "mais cela ne suffit pas pour former la
gaine ; car il y a encore un autre suc
qui est sorté de la peau intérieure par les
fibres qui y sont. Ce suc est la
somme des mâles et les animaux."

Crew Anatomie des Plantes



André 1697

N 221-222

