

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045](#) | [Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-6-chem](#) | [Grew. Ray. Vaillant. Malpighi. Geoffroy.](#)
[ItemLa graine est formée à partir des sucs mâles et femelles](#)

La graine est formée à partir des sucs mâles et femelles

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0189

SourceBoite_045-6-chem | Grew. Ray. Vaillant. Malpighi. Geoffroy.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La gaine et le canal à l'extrémité des
mâles et femelles

189

1 Il y a un suc qui passe à travers le
membrane "acrotin" et "par une
espèce de transmission" : "ce qui est en haut de
la cavité est à peu près à l'échelle de (Poulet)
ce qui est la figure qui est en forme d'un
seul ou la somme des femelles et les
animaux."

2 "mais cela ne suffit pas pour former la
gaine ; car il y a encore un autre suc
qui est sorté de la peau intérieure par les
fibres qui y sont. Ce suc est la
somme des mâles et les animaux."

Crew Anatomie des Plantes



André 1697

N 221-222

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..