

La reproduction des champignons

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0219

SourceBoite_045-7-chem | État actuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

219

La reproduction du champ. (mammif)
(Basidiomycètes)

Les champignons qu'on trouve "à l'échelle" comprennent

- 1. champignons à plasmogamie directe avec le champignon
- 2. si hyménium formé de cellules + petites et généralement humides (hyménium)
- 3. l'hyménium formé de cellules cylindriques ou en forme de massue
 - certains de ces cellules (les basides) portent à leur sommet des petites poches (2 ou 4), les sterigmates ou comme on les appelle tout fixés les spores ou basidiospores.
 - les autres cellules ne sont souvent que des cellules brisées, les prophyses ou basidiolles.
- A de nombreux aspects, on voit souvent



de g des cellules, les cy, hém, 1000
de poix, 1000.

- les spores en germe produisant
le mycélium - on voit végétation de la
jeune li.

- sur le mycélium les + jeunes du mycélium
on voit apparition des petites boutures blanches
qui constituent le mycélium reproducteur du
champignon.

J. B. Pot.

Mouche végétale.