

R. Owen. On parthenogenesis

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0236

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

(on parthenogénèse 1849)

- The érolution = $n \times$ de deux éléments d'éléments
♂ et d'élé. ♀. Après la fécondation, l'œuf
(élément ♀) se divise pour donner l'individu.

Cette division n'est que 1 rep. qui se renouvelle
mais que chaque élément nouveau reçoit une part
de l'élément qui reçoit du spermatozoïde.

- Or le pouvoir du spermatozoïde est limité, il
ne peut produire que 1 autre fini de division, (donc
le meilleur est +)

- Dans certains cas, le pouvoir fécondateur du
spermatozoïde n'est pas épuisé avec la formation
de l'individu. Dans ce cas, l'individu ainsi
produit est très fertile, et alors

- ou bien il produit des œufs qui sont
capables de se développer sans elle fécondation
(c'est la parthenogénèse des racines, des abeilles,
des aphides)

- ou bien il produit des larves, ^{c'est à} qui
se organisent en $n \times$ individus (parthenogénèse)

- ou bien il produit des larves, etc.

BnF
MSS

qui peuvent se débiter

Ts en plus de s'ion agone, Owen
en appelle méto génèse.

Objection :

- la possibilité de reproduire sans fécondation peut se prolonger indéfiniment ou se terminer (la parthénog. du pueron, le bourgeonnement du Hydra)
- chez les inérieurs, la division se produit sans fécondation.
- De 2 points, fécondation et division, Owen a choisi le 1er / chat fond? - mais on pourrait supposer le contraire : la division rend le point dominant, la fécondation n'est nécessaire que d' certains conditions de l'organisme (cf. E. Perrier : les colonies animales et la formation des organismes . p 701)

E. Perrier . q 300f.

anat Derrien (n° 224
228)