

La reproduction alternante chez les animaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0237

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La reproduction alternant les 2 sexes

237

1. Les observations

En 1819, Chamisso avait remarqué que
en 2 catégories de saupes qu'on connaissait
(les saupiches, elles se grègent beaucoup + petites et
vivent en couples chèvres) et une modifiée en
une m^{re} l'autre : la ressemblance toute de 1
g^{re}

En 1828 Michael Sars découvrit un polype
(qu'il appelle scyphistome) ~~produit~~ se transformant
au cours de sa croissance en 1 autre la scyphide
qui a son tour produit de petites méduses.

Ces observations furent par Lorenz, Dujardin,
Quatrefages, Reier, Van Beneden.

2. J. ~~Steenstrup~~ Steenstrup (Ueber den Generations-
wechsel 1842) avance l'hypoth. que si on
en animaux, un être issu de forme d'ovaire
ne donne naissance à des êtres asexués, si
au m^{re} pour, mais qui se reproduisent ou
divisent pour donner des êtres sexués.

BnF
MSS

Le scaphistome et le aréus ont 2 ibn
équivalents : l'Z reur, l'adulte à sexer,
l'individu reur produit le oeuf, mais il
meurt avant de voir pu mener à l'ibn l'éduca-
tion du larve : cette educ. est confiée à l'individu
accusé. Celui-ci veut que l'ibn de g'en soit
il doit assurer le deuk (la "nourrice" : Steensbeek)

Il en est de même chez les pueris, les abelles,
les pueris

3. La M. de Steensbeek a été modifiée mais
en gros acceptée. On a reconnu que chez les
salpes, ce sont les oeufs formés chez le solitaire
qui se développent chez le agresseur.

Balchani affirme que chez les pueris, la
formation et la pondation des oeufs nécessitent
l'apparition de ~~oeuf~~ ^{l'individu} qui leur va comme un
m.

Van Beneden (Mémoires sur les Céphalopodes
Bulletin Ac. de Bruxelles 1847) pense
que la g'en agresseur n'est qu'un cas
particulier de la Sigenia : i.e. la coexistence