

La fusion nucléaire dans la fécondation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0244

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La fusion nucléaire du 1^{er} secondaire

244

10. Hertwig (Beiträge zur Kenntnis der Bildung, Befruchtung, u. Teilung der tierischen Eier - 1876) montre que la fusion du 1^{er} secondaire s'accompagne d'une conjugaison du noyau. Il dit in fine "le secondaire est en g^{énéral} la conjugaison du 2^e noyau." Mais il veut que les corps des 2 cellules adhèrent à cette fusion.

Ballour (comparative embryology 1880. I. p. 69) : "l'acte de fécondation a pour résultat que y la fusion de l'ovule et du spermatozo^{oide} ~~est~~ ^{est} la + importante et est la plus importante du noyau mâle et du noyau femelle."

BnF
MSS

2. Pflüger fut le 1^{er} à montrer que le corps cellulaire des cellules germinales n'est pas de même nature que les cellules somatiques.

en deux territoires. "Isotropisme":

on peut naviguer le long d'une de
la symétrie de différents points du corps
de l'oeuf, en retournant à la position normale.
celle de l'oeuf de la position normale.

C'est la preuve que le corps ultérieur de
l'oeuf se compose de parties homogènes; donc
que les organes différenciés du développement
sont préconstruits initialement.

Plus tard, cependant, on conclut à tort
que la différenciation se produit sous les
conditions extérieures du stade de l'oeuf.

3. Roux a montré (Beiträge zum
Entwicklungsmechanismus des Embryo
1884) qu'en supprimant le tiers des
"conditions extérieures"; la réaction, l'oeuf
"se développe normalement": "il sort de
lui-même les formes nécessaires à la
vie normale."

4. O. Hertwig (Ueber Einfluss