

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.](#)
[ItemHomologie des organes femelles cryptogammes, gymnospermes, angiospermes](#)

Homologie des organes femelles cryptogammes, gymnospermes, angiospermes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0302

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Homo posit de organe ♀ { Erythog. 302
Gymnost.
Angiosp.

Le sac embryonnaire est assimilable
à une microspore.

1) Le nothate, qui se forme dans le
sac, est représenté chez le gymnosperme,
par l'embryon ;

chez le Angiosperme, il est représenté
par le saccule de l'appareil ovule, le
anthrode et les deux noyaux polaires.

2) chez le gymnosperme, l'une des
cellules ^{endospermiques} forme une archégone rudimen-
taire ; et un chez le Walpitschitz, elle
devient direct et ovulifère.

cette réduction de l'Archégone se combine
chez le Angiosperme : les synergides
se peuvent se transformer aux cellules
du canal de l'archégone ; il y a de
cellule endospermique, qui par une
adaptation à une fonction nouvelle ont

acquis une forme et une place précieuse.

Guignard. Recherche sur le
racisme bretonnais
de Phan an.

Ann. sc. nat. 6^e série XII
1882

r 189.