

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.](#)
[ItemHomologie des organes. Guignard](#)

Homologie des organes. Guignard

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0303

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Homologie de organe $\rightarrow$ } cryptogames
 Guignard. } gymnosper.
 Angiosper.

303

Formation du microspore et du grain de pollen

* Le sac pollinique présente 2 tétrades de
 microspores morphologiques et anatomiques de
 la paroi à sa base avec le sporopollène des
 cryptogames.

- d'abord et ensuite les cellules mères
 naissent par mitose de cellule de bord
 réunies en tissu ; les cellules ~~se~~ mères se
 divisent en 4.

- le grain de pollen se divise en deux
 cellules, la cellule formant le tube
 pollinique pour le rôle pp^{te} de la fécond.
 lui, l'autre contenant le pollinule.



La diminution du pollinule de cellule
végétale

Le pollinule $\rightarrow$ issu de la microspore
 ne peut se diviser

- D'abord le sacogonide est
modifié par un mâle qui est issu
de la microspore.

mais la plante y manifeste
Pitularia, le sacogonide est modifié
à l'intérieur de la microspore.

Milardet : le contenu morphologique
de la microspore se divise en 8 cellules,
qui se divisent en 4 → 32 cellules
mères de sacogonides.

Le corps pluricellulaire est érigé
de la corolle.

Et émettent, plus d'une fois
de graine aux places où le mâle
est mort.

Guignard. Rech. sur le
sac myonnette par. enjoli

Ann. sc. nat. 6^e s. XII

1882.

184-186.