

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.](#)
[ItemGymnosperme](#)

Gymnosperme

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0308

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

B. Gymnosperms

- L'accès du péricarpe est libre par la disorganisation de la paroi utérine qui se dissout.
- Le hôte pollinique est un nœud de 2 noyaux avec 1 mbr de 100 m² de surface. Le noyau est issu de la division du noyau géniteur chez le Pinus, de la 1^{re} division du noyau chez la Cupressus.

M. Van ~~Thy~~ Tiegheun.

Thèse de B o l s . I . 1902
906

V. T. source d'uniquen ref: en
hanc Untersuchungen über Befruchtungsvorgang de Stoschinger (84)



