

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.](#)
[ItemStrasburger](#)

Strasburger

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0314

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

En 1884 Sträuburger put voir au microscope que le Pollenschlauch (tube pollinique?) n'était ni fermé, mais qu'il était ouvert à son extrémité inférieure par des Aufquellen de la membrane; et qu'il y avait des vides par le Keimsack (ovule?) à l'endroit où il touchait le tube pollinique.

Par cette observation les 2 notions que contient le Pollenschlauch en haut et le Keimsack et rien d'autre ne peut s'unir avec le noyau de l'ovule.

BnF
MSS

- Du coup on découvre complètement le fonctionnement du mécanisme antérieur de l'ovule par O. Hertwig en 77

- Sträuburger nous a donné ses conclusions

- il a admis que le noyau du germe et de l'ovule chient de vivre les noyaux

ultra-croix) ; chaque baryte comme
un instrument de ce processus de
transformation.

— il s'agit aussi que les morphologies
du pont chuit transmissibles par le noyau
de sperme ; que il y a donc des
noyaux ultra-croix qui se transmettent
de l'organisme par direction
spécifique du sexe :

M. Möller. Geschichte der
Biologie

r 342.