[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming. Item\[Guignard et embryogénèse des graminées\]](#)

[Guignard et embryogénèse des graminées]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0316

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Concl. de Guignard à son étude
sur l'Embryogénie de gymnos

316

confirmation de travaux de Strasburger
ou de Pankov (cf Warming et Vayer)
qui imitent la voie du sac embryon.
naire ~~de~~ vers le stade de pollen au 1900.

" Ma le pollen n'est dans le sac
embryonnaire de Angiospermes, représentant
de pollen indospermique analogue à
celle qui se forme et le sac embryonnaire
de Gymnospermes.

L'ovaire formé et elle seules un
archegone très réduit, le stigmate
n'est elle ni que de cellule d'indosperme
adaptée à une cellule fonction.

L'athénisme qui n'est à part la sécond.
tion par la division du noyau directrice

BnF
MSS

ne tenet que la remi d'orte que
10 h) in tempu.

L. Guignard. Recherche,
sur l'Embryogenèse des
Resumatus.

An. 10. n. 6. 6^e série.

1881. p. 142. XII.