

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming. Item](#)[Les divisions du noyau des sacs embryonnaires selon Strasburger](#)

Les divisions du noyau des sacs embryonnaires selon Strasburger

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0318

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les divisions du noyau du sac embryonnaire
s/ Strasburger.

318

Sur l'orchée patens, de la oule
"résumé" à l'observation.

1 Le noyau du sac embryonnaire se
divise en 2 noyaux égaux qui se rendent
aux 2 extrémités. Chacun d'eux se
divise de nouveau, et cela encore 1 fois.

De sorte que finalement le sac embryonnaire
contient 8 noyaux, 4 de la région
microcytaire, 4 de la région chalazidienne
en division, 10 paires et de plus, 2 extré-
mités.

- 3 des noyaux de la région inférieure
sont très petits et composés de 2 ventres
et de 2 synergistes ; 3 des noyaux infé-
rieurs sont très petits au total.

- Le 4^{ème} noyau de la région inférieure
est le plus grand et se compose de 2 ventres et de 2

fonctionnel von 6 million du 12e m
esther 6 voyen popr.

(vient repoi d Ueber B. fruchtung
u. Zellteilung. (Tuz 1878)

2. Des Bot. Zeit. (4 mil 1879)

Schweizer in berage sur u n
voyen : il montre qu 2 la suite de
la fission, c'est lui qui donne nais-
sance, m divisions successives, d'ou voyen
u des permigues, dont certains vont
diminuer l'antiquite des h's d'ou
naissance d'ou.

Str. demont que la formation
cellulaire d'ou le 12e embryonnaire est
que le resultat d'ou

Guignard. Rech. d'Embryologie
visible par.

Ann. sc. nat. 6^e serie XII -
1887. n. 12. 13.