

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-11-chem | Hofmeister. Item](#)[La fécondation chez les mousses. Hofmeister](#)

La fécondation chez les mousses. Hofmeister

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0321

SourceBoite_045-11-chem | Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

321

la Fécondation chez les moules.

H. Foucault

"chez les m. c/chez les Fougères, la
allure caractéristique de l'archigone se compare
à un sac embryonnaire"

cette cellule grandit → remplir la moitié
du sac embryonnaire. c'est le moment de
la maturité

"que les archigones de moules puissent
glisser... Je compare le sac de l'archigone
et disant que c'est la même chose
de l'archigone, que ils y mettent un
rapport avec le moi externe de la cellule
embryonnaire, c'est ce dont je doute
surtout moins que j'ai trouvé d'un
archigone de Funaria hygrometrica,
des archigones vivants qui avaient déjà
mûrissu le haut de la tige du cot.

La formation ordinaire des archigones
de moi de l'archigone et la lenteur

de la Kerosoioie, veuvant suff-
volition qui na pu pargueri d'ou-
mir le sort ultérieur de ce spirituel.

\$
Hofmeister. epistola
P~~ro~~doc. royale de re.
de 1221. (22 Août 54)
ceint in Ann. se. net.
4^e 1000 I. 1373.
1854