

L'analyse de Hofmeister

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0323

SourceBoite_045-11-chem | Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

De son Vergleichendes Untersuchungen
(1849), Hofmeister nous met devant les yeux

1 une génération prothéciale spore,
qui produit des éléments motonema
engendrés du type feuilleté (avec au thécis,
archégone, oosph) - gen. sexuel

2 une 2^e génération : les oosph se développent,
sur la feuille n, en sporogones avec
thécis, avec thécis. Ces organes n'ont
pas de spores. - gen. asexuel.

Il nous reste à nous occuper de la Fougère

1 spore prothéciale de prothécis qui ont
à la surface inf^{re} de la feuille) donne
naissance à un motonema, avec au thécis,
archégone, oosph.

2 ces oosph, germe, vont donner une
nouvelle prothécis.

BnF
MSS

Ho furei a trovare le radici
di una ~~formazione~~ le Phosporine.
It mostra que l'indio del ~~micro~~ et
riduzione ~~que~~ a tutte.

Pennetier / Disc. sur l'évot.
de ces an thibain
nab.

4' mlt hsc. 3. r 235-6)