

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-11-chem | Hofmeister. Item](#)[Alternance des générations dans le mouvement et les fougères](#)

Alternance des générations dans le mouvement et les fougères

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0326

SourceBoite_045-11-chem | Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

L'alternance de génération de la mouche et le longicorne (Hyménoptères)

326

- la 1^{ère} génération (celle ^{qui vient} du sport) est destinée à produire les organes sexuels, mâles ; c'est leur coopération qui produit la "mother cell" minuscule de la 2^{ème} génération. Cette mother cell existe dans la cellule controlée de l'organe femelle.

Cette xénogamie produit un corps cellulaire qui donne mouche, forme le rudiment du fruit, de la cellule cryptogame vasculaire, l'un cryon.

- L'objet de la 2^{ème} génération est de former de nouvelles cellules reproductives (les spores) dont la germination reproduit la 1^{ère} génération.



La plante de mouche correspond aux mycéliums du cryptogame vasculaire, le fruit de mouche correspond à la longicorne aux ~~seuils~~ seuils et aux spores.

Le mo-cu-cryon qui est modifié par
les spores du mouss n'est pas une généra-
tion spéciale que le supérieur (qui est
personne analogue) chez le Phénomène.

- La vie végétative du mouss est réservée
à la 1^{re} génération ; la fructification à
la 2^{de}. La hgt feuillée du la mouss
envoie les racines ; et les jeunes hgt du spore
hgt sa nourriture de la 1^{re} génération. La
vie du hgt est la + courte que celle du
la plante qui porte la feuille.

- L'absence d'les cryptogames
vasculaires. Il est vrai que le mouss
envoient des racines capillaires. Mais le
mouss n'est pas moins le hgt que
le hgt qui porte la feuille (elle-ci
peut vivre un an ou deux avant d'avoir des
fruits).

W. Hofmeister. On the germinations
of Higher Cryptogamia 1862.

H 474. 336.