[Observation de l’acte de fécondation - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0330
SourceBoite_045-11-chem | Hofmeister.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le entier bien grenu et il pour
tes pâle, quelques brillants, contrast au
contraire maintenant à son sein,
quelques gros granules verts qui montrent
certains de la masse intérieure des spermato-
zoïdes.

– Peu de temps après la conjonction
les bords du globule femelle deviennent
de mieux en mieux définis et finalement le
corps s'enveloppe d'une membrane
qui laisse voir 2 contours très distincts.
De sorte ainsi la cellule du nouvel
organisme, itself extérieurement, tout dans
son enveloppe que à son contour,
des modifications qui le rendent capable
de résister aux influences extérieures
des tractions de la vie végétative :

Principalement. Fécondation et germination
alternative du
oeufs.

BnF MSS

Ann. sc. nat. 4e série V
p 255-256. 1856

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17604?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17604?context=pdf