[Observation de l’acte de fécondation - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0330
SourceBoite_045-11-chem | Hofmeister.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Très entière finement grenue et d'un jaune assez pâle, au lieu brillante, contient au contraire maintenant dans son sein, quelques gros granules verts qui proviennent certainement de la masse intérieure des spermatozoïdes.

— Peu de temps après la fécondation les bords du globule femelle deviennent de mieux en mieux définis et quelquefois le corps s'enveloppe d'une membrane qui laisse voir 2 contours très distincts.

Devenu ainsi la seule cellule du nouvel organisme, il subit ultérieurement, tant dans son enveloppe que dans son contenu, des modifications qui le rendent capable de résister aux infl. perturbatrices ou des fonctions de la végétation ?

Pringsheim. Fécondation et génération alternante des Algues.

Ann. sc. nat. 4e série V
p 255-256. 1856

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17604?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17604?context=pdf