

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[Item](#)[La description des anthérozoïdes de Chara \(jusqu'à Thurel\)](#)

La description des anthérozoïdes de Chara (jusqu'à Thurel)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0396

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La description des Anthérozoïdes de char
(du genre Thuret)
Hétérogènes.

396

1. Hedwig avait établi la différence chez
les char, les moules et les Hépatiques,
de 2 sortes d'organes qui servent à la
procréation

- le 1 qui se trouve généralement grand
- le autre qui durent peu de temps
(les anthérozoïdes) : il en sort 1
liquide visqueux

2. Nees d'Éichenbeck et Bischoff veulent
prouver que les corpuscules et le liquide
sorti des anthères des Sphagnum et des
char.



3. Klinger (en 34) en se servant de
microscope + prouvant qu'on se met à l'œuvre
en 1830, vit que les corpuscules issus
de l'anthère du Sphagnum chassés dans
un liquide et n'avaient aucune vitalité.

4. Varley (en Angleterre, 1834)
décrit les corruccles issus de char
q 1 spin rigide se prolongeant en
fourche le rigide ambiant.

4. Thuret, en 1840 publie un mémoire
où il décrit les oïdes de char :

1 corp filiforme, roulet en tire bouchon, avec
de 3 à 5 bords de spin, et à l'extrémité
ant^{re} de la spin deux coit, les bords
qui sont apités co-hérants.

5. En 43 Thuret a trouvé de
un oïde de m type chez la Hépatique
et le moule.

Bornet. G A Thuret, esquisse
histologique

Ann. sc. nat. 1875-6 serie

p 312-313 17