La sexualité des algues au début du XIXe siècle

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0398
SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La sexualité des Algues au début du XIXe.

- En + des spores, on a reconnu des bons organes, mais on ne pas ~~les~~ ce que c'étaient des antéridies

- certains y voient, sous le nom de Microphytes, un 2d mode de de reproduction à côté des spores.

Mr Montagne : Ann. Sc. nat. XVIII. p 200 est aussi l'opinion d'Agardh (Algae maris Mediterranei et Adriatici p 24)

BnF MSS

Decaisne et Thuret.
Rech. sur les Antéridies et les spores des Algues Fucus.

Ann. Sc. nat. Bot. 3e s. III. 45
p 5-6.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17672?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17672?context=pdf