

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemAnthéridies et spores des Fucus](#)

Anthéridies et spores des Fucus

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0399

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

(Decaisne et Thuret 1844)

Observations faites in vitro sur le rôle
de la manche.

L'hypothèse d'un rôle de respiration
organique, qui on a vu se produire dans
un certain nombre de hénidies
(déjà connues chez certains cryptogames).

- On a pu noter chez certains Fucus
verrucosus, de "vésicule ovoides, contenant
une masse blanchâtre formée de granules
rouges." Ces hénidies sont portées sur
de longs et "chaque alvéole d'entaille elle est
un peu et une vésicule bien marquée,
sorte de pénisore qu'elle creuse par le
traverse et le point d'insertion."

- Les alvéoles, contiennent "de nombreux
corpuscules bruns, noirs ayant à peu près
la forme d'une bouteille, qui coexistent avec

une extrême virauté: chacun de ces corpus-
cules renferme un germe rouge... Les
organes periconomides ou lentus 2 et
très petits, de couleur intégrale "

"Ns devons bien remarquer l'analogie
de ces corpuscules avec ce que l'on a
nommé le zymotone, spermatozoïde du
char, du moule et de Haptophyte. "certes
leur structure diffère "mais un Fucus
lui-même peut être différent de moule ou d'un
Haptophyte."

- les receptacles femelles : "si on les
examine au moment de leur de-
couverte sur la plante à rec, on
voit les spores sortir en grappe de concep-
tible. Une coupe mince montre alors
les conceptacles brisés. Il n'y a aucune
de pénétration visible."

Chaque jour au bout d'un certain temps