

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLes organes femelles des fougères. Leszic-Suminski](#)

Les organes femelles des fougères. Leszic-Suminski

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0402

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le organe femelle de l'organe

402

Leszye-Juminski

Naegele a bien décrit le σ et le ϕ de
Fouquet : " mais si il a été guidé par les
recherches par son ϕ faux, il a attribué
la diff^{er} de ce organe à un degré diff^{er} de
de dev^{er} ; l'ind^{er} qui est un σ et le organe
est un ϕ ; car leur structure est, ainsi
que leur rôle physiolog. le démontre
à cet égard bien distincts : "



— Les σ et ϕ décrits par Naegele

à l'organe " La base inf^{er} du mem-
branes présente une de son échancrure
et sur la saillie médian d'un organe
+ volumineux : corps ovoïde, creux,
composé de la réunion de 10 à 12 uples
Elles forment une masse ouverte par un
cratère avec au centre un orifice.

" Il y a reconnu l'organe femelle

de Fougères). Et apparaît et un
ovule ren. bismant, ou 1 simple nuelle
n. Il se divise en 2 portions; l'une
+ développée, + l'autre, portant soignée
la mer du ^(mollusque) même ovule, et le même
nuelle; l'autre + petite est la cavité
du nuelle.

- "A l'éclosion de l'ovule, formant du même
nuellein, on voit apparaître au fond de
la cavité du nuelle, une petite cellule
mère, qui n'est autre que le sac
un bismant."

- A cette époque déjà on trouve
des sautoires qui sont penchées sur
la cavité du nuelle.

Si, il y a tout rendu, on le moule
gros + l'humidité qui ouvre la
mer du inf du mollusque

Zur Entwicklungsgeschichte
der Farnkräuter. (Berlin 1848)

Recht in Ann. sc. nat. 3^e XI. p. 117. 121
1849