

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLes cycles des fougères](#)

Les cycles des fougères

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0403

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les cycles de Fougères.

403

Analogie spor - bréon : fleur

(Lesqye - Suminski)

Le spor de Fougères ne doit être
assimilé ni à l'organe féminin (cf
c'est en ly de Bolovitch) ni aux autres
(cf la cru Hugo Mohl)

"Et là, quant à la nature phyto-
gène, une grande analogie avec le
bourgeon à fleurs de la plante sup-
maire. En effet, il faut bien se remem-
brer : le bourgeon à fleurs de
Fougères ou le spor ne doit que son
origine à l'influence de la plan-
te, mais que elle ne crée pas une
plante nouvelle et qu'elle produit en fait
une nouvelle plante, non une fleur,
mais encore le bréon qui

B.F.
MSS

doit donner naissance à une plante
~~mat~~ de la même espèce.

Au moment où l'organe à fleur de
pharogones naît, comme un embryon
et petit "fœtus" et "l'individu"
de la plante mère ... la spore doit pour
maler devenir d'après du stade d'un organe à
fleur de plante sur re.

Le monembryon (= monothalle) "monoblaste"
de la végétation de Fougères est une formation
intermédiaire entre la spore et la plante,
dont il ne s'agit pas d'un # individuel unique;
car issu de la plante mère, il se nourrit
de la sève, il ne peut donc se développer
sans la fécondation, il devient le véritable nourricier
des fleurs, par la naissance de l'embryon celui
du fruit, par la germination, celui de l'embryon,
et c'est il fournit au jeune germe ses nourriciers, il
remplace l'albumen de pharogones.

Zur Entwicklungsgechichte der
Farnkranter. (Berlin 1848)

Erl. in Ann. d. Nat. 3. s. XI. Nr 128-5
1849