Le polymorphisme des champignons

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0411
SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17685?context=pdf

Le polymorphisme des champignons.

Le cycle de la rouille du blé comporte

— la forme uredo (avec mycelium sur les jeunes plantes) → uredospores.

— la forme puccinia (sur le sol) → téleutospores)

— la forme aecidium (sur les feuilles de épine-vinette) → aecidiospores

— celles-ci vont germer sur les jeunes pousses de blé et donnent la forme uredo

BnF MSS

Ces travaux commencés par les frères Tulasne, et repris (sur le plan expérimental) par de Bary

Peuchet. Dict. sur l'Hist. de q. des H. N. 4e partie. Doc 3. p 242

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17685?context=pdf