

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLes travaux de Thurel sur les algues](#)

Les travaux de Thurel sur les algues

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0416

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le travail de Thuret sur l'Algues.

416

- En 1840, Thuret (grecchi) en s'occupant
avait découvert les anthémidies des chares : chaque
cellule de cette espèce porte 2 cornues à 180°
l'une de l'autre.

- En cours de sa découverte, il avait été à
l'origine de la Fucine l'époque où il avait
la découverte de l'anthémidie. Ses recherches
ont été examinées in vivo, au laboratoire.

Le 11 nov 44 il a découvert à l'Ac.
de la découverte de l'anthémidie
de la Fucine.

- En 47 l'Ac. des sc. propose / accepte
comme "le mot ... de corps renfermés"
les Anthémidies des cryptogames : Thuret
a été élu (Ann. Sc. nat. 1850)

- Il a été des années d'hybridation sur
la Fucine qui lui permettent d'établir
mécanisme de la frondaison (1854)

- Me. trinité le rv de l'algues venant d'être

Algues rouges

- Par les Algues bleues, Thuret a constaté l'absence de reproduction sexuelle, les individus se reproduisant par spores.

- Avec les Algues rouges, d'après les travaux de Bory de Saint-Vincent (1866) que le gamète mâle (pollinifère ou spermatozote) très immobile s'accroche physiquement avec le poile (mitochondrie) de l'ovule mitochondrial. C'est par ce moyen que s'opère la fécondation de la progamète.

Tous les travaux ont résumé dans son ouvrage intitulé le Étude Phycozoologique (78)

J. F. Edmann

in Histoire de la Botanique

Paray de Villiers. n° 206-9