

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique. Item](#)[Principes de la psychosomatique d'Alexander](#)

Principes de la psychosomatique d'Alexander

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0630

SourceBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Pjes de la psychosomatique d'Alexander

630

1 Conversion et syndrome psychosomatique

Certaines émotions sont écartées de l'ac. par refoulement. Les excitations nerveuses qui leur correspondent ne pouvant s'exprimer par la voie normale

- ou bien, s'il forme différentes ^{elles empruntent} voies de l'innervation végétative (expression, perceptions sensorielles) → hypertonie de certains

- ou bien en impulsions déviées vont modifier (stimuler ou inhiber) les fonctions végétatives. → syndrome psychosomatique

2 Troubles vago et sympathico toniques.

Les réac. normales de l'émotion sont sympathico toniques (décharge d'adrénaline)

- par suite d'inhibition, la décharge musculaire de l'inhibition ne pourra se produire - mais la lésion affective persiste, avec phéno végétatifs.

rien troubles fonctionnels
→ hyperlension psychosomatique

- chez d'autres individus, il y aura, non
seulement inhibition, mais regression: pr suite
de la regression, la réar. émotionnelle normale
(lymphothotonique) se transforme en son
antagoniste (hyperisotonique)
asthme, ulcère gastrique.

De ce côté physio, aucun élément psycho-
gène: "il s'agit d'un dysfonctionnement physio satis-
faisant, que l'on oblige à fonctionner es
des conditions anormales de durée (de la 1^{ère} au)
de durée et de durée de la 2^e" (Mansel)

Mansel (R. de Van
Juillet 1952)