

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique. Item](#)[Psychogenèse des ulcères à l'estomac](#)

Psychogenèse des ulcères à l'estomac

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0633

SourceBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Génèse des ulcères d'estomac

633

Il semble que les ulcères d'estomac soient dus - à l'chang^{mt} hyperplasique de sa muqueuse (gastrite hyperplasique) - et on sont dus sans doute à l' trouble fonctionnel de l'organe (hyperacidité)

1 "Le facteur crucial de la pathogenèse de l'ulcère est la frustration du désir de dépendre de recherche d'affection et de soutien." Desirs

(a) qui peuvent être surcompensés dans des attitudes agressives : "les luttes continues et les responsabilités excessives qui s'imposent renforcent le désir de dépendre"

(b) qui peuvent se manifester direct^{mt} chez des sujets qui recherchent protection, avec des tendances féminines.

D'où : 2 types de personnalité ayant des ulcères d'estomac.



2 Considérations psychosomatiques : par régression "le désir d'être aimé" se transforme en besoin d'être nourri. Le refouel^{mt} de ces désirs d'être aimé et d'être protégé mobilise le système nerveux de l'estomac."

d'activation de ces processus sert de stimulus permanent de la fonction gastrique.

Ex : étudiant de 23 ans ; ulcère de duodenum provoquant la 1^{ère} hémorragie à 18a
A l'âge de 13a il a vu perdre son père aîné ;
et à 15a son père. Sa mère reporte sur lui ses
propres besoins de dépendance - son attitude
d'imperforable sécurité ne lui permet que l'expression
chronique de l'insécurité.

1^{er} des rêves qui illustrent l'analyse :
il est en bicyclette avec sa mère. Il tient le
guidon ; mais perd le contrôle ; il tombe.
Sa mère est blessée, p.p. morte

Confirmation expérimentale :

Mahl (article de Yosom. mod. 1949) a
montré, sur des chiens, que la peur chronique
provoque l'augmentation de la sécrétion
gastrique.

La médecine psychosomatique

H 88. 102