

Le dimorphisme des fleurs hermaphrodites et la fécondation indirecte

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0505

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le dimorphisme de fleurs hermaphrodites
et la fécondation indirecte

Ch. Darwin a 1 memoire des Procé-
dés de la loc. linnéenne et de la

Prunelle ; et note 2 formes de fleurs
hermaphrodites. 505

- Les Primaveras long et stylées avec 1
style long et des étamines courtes ; pollen
oblong.
- Les Primaveras brièvement stylées avec
1 pistil court, des étamines allongées,
le pollen rond et + volumineux.

Aucune gradation entre les 2 formes.

- En le vivant d'un tel courant d'âge,
il se peut

- que les plantes à court style ne donnent
que 50 gr. p 27 umbelles,
- que les plantes à long style ne donnent
aucune graine p 74 umbelles.

L'intervention des insectes est donc
indispensable.

- Normes ad de feronshon
artificielle :

- homomorphes (long style - long
et univers)
- heteromorphes / long style - court
style et univers)

Le 2^e ou 1^{er} ite + feronshon d'1 morphon
de 64 à 40 p Primula sinensis ; et de
54 à 35 p Primula veris.

On peut de conclure

- l'ind^u de la nature a l'origine :
- " le but de la nature est de traverser le
croisement en individus distincts "

cité in Geog.

De la feronshon naturelle de
artif. de végétation.

2^e ed 1862.

n 70-75